

TABL. 8 (150). **ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA**
INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS

CHOROBY	2005	2009	2010	2005	2009	2010	DISEASES
	w liczbach bezwzględnych in absolute numbers			na 100 tys. ludności per 100 thous. population			
Tężec.....	2	-	2	0,1	-	0,1	Tetanus
Krztusiec.....	23	23	28	1,1	1,1	1,3	Whooping cough
Odra	1	-	-	0,05	-	-	Measles
Wirusowe zapalenie wątroby	115	80	113	5,5	3,8	5,4	Viral hepatitis
w tym typ B	44	45	67	2,1	2,1	3,2	of which type B
Różyczka	298	231	201	14,2	11,0	9,6	Rubella
Salmonellozy	1111	629	805	53,0	29,9	38,3	Salmonella infections
Czerwonka bakteryjna.....	4	15	2	0,2	0,7	0,1	Shigellosis
Inne bakteryjne zatrucia							Other bacterial food borne
pokarmowe	40	38	4	1,9	1,8	0,2	intoxications
							Diarrhoea and gastroenteritis
Biegunki u dzieci do lat 2 ^a	1065	1980	1989	259,3	447,3	446,0	of presumed of infections
Szkarlatyna (płonica)	324	387	457	15,4	18,4	21,7	origin (under 2 years) ^a
Bakteryjne zapalenie opon							Scarlet fever
mózgowych i/ lub mózgu..	43	43	37	2,1	2,0	1,8	Meningitis
Wirusowe zapalenie opon							
mózgowych	126	55	99	6,0	2,6	4,7	
Wirusowe zapalenie mózgu	48	46	26	2,3	2,2	1,2	Encephalitis
Świnka (zapalenie przyusz-							
nicy nagminne).....	1922	86	107	91,6	4,1	5,1	Mumps
Toksoplazmoza.....	36	.	.	1,7	x	x	Toxoplasmosis
Tasiemczyce.....	1	1	.	0,0	0,0	x	Cestode infestations
Świerzb.....	642	.	.	30,6	x	x	Scabies
Grypa.....	13406	47221	15936	638,3	2248,2	757,9	Influenza
Szczepieni przeciw wście-							
kliźnie.....	704	488	588	33,6	23,2	28,0	Rabies vaccinations

^a Wskaźnik obliczono na 10 tys. dzieci w wieku do lat 2.

U w a g a: Od 2009 roku nie ma obowiązku zgłaszania zachorowania na toksoplazmozę, tasiemczyce i świerzb.

Ź r ó d ł o: dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH oraz Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc i Instytutu Wenerologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

^a Ratio calculated per 10 thous. children up to the age of 2.

N o t e: Since 2009 reporting incidence of toxoplasmosis, cestode infestations and scabies is not compulsory.

S o u r c e: data of the National Institute of Hygiene – PZH as well as Tuberculosis and Lung Diseases Institute and Institute of Venerology of Medical University of Warsaw.